

ГЕОМЕТРИЯ В КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ

Лекция 1: Введение и геометрия плоских кривых

Богачев Николай Владимирович


12 сентября 2019

Московский физико-технический институт,
Кафедра дискретной математики,
Лаборатория продвинутой комбинаторики и сетевых приложений

Введение

О чем вообще идёт речь?



Геометрия повсюду!



О чем вообще идёт речь?

Как можно думать о геометрических формах и объектах:

- математически
(дифференциальная геометрия)
- как о дискретных структурах и сетках
(дискретная дифференциальная геометрия)



Основные цели курса:

- Помогаем компьютерам!
- **Центральная идея:** Гладкое VS. Дискретное







Рис. 1: Поверхность Боя, Обервольфах, Германия и бутылка Клейна



Приложения: Geometry Mesh Processing






Приложения: Мультимедиа



Приложения: анализ форм и изображений



Приложения: симуляции



Приложения: архитектура и дизайн



- Страница курса:
<https://nvbogachev.netlify.com/teaching/gcs19f>
- Связь: по почте nvbogach@mail.ru
- Лекции: слайды и, возможно, конспекты!
- Семинары: листочки с задачами и домашки (= S)
- Лабораторные работы: Python ... (= L)
- Контрольная работа: MidTerm (= M)
- Итоговая формула оценки за зачет:

$$\text{Exam} = \lambda_S \cdot S + \lambda_L \cdot L + \lambda_M \cdot M.$$


Общий план (лекции + семинары + лабораторные)

- Гладкие кривые и поверхности
- Дискретные кривые и поверхности
- Внешние формы
- Дискретные внешние формы
- Лапласиан!
- Сглаживание и деформация

Развитие геометрии

Дифференциальная геометрия – вплоть до 20 века

- Локальные свойства формы
 - Скорость движения вдоль кривой
 - Локальное поведение поверхности и т.д.
- Связь локальных свойств с глобальными
- Всевозможные соотношения и развитие дифференциальной геометрии многообразий




Дискретная дифференциальная геометрия – 21 век

- Никаких больше бесконечностей и производных!
- Все выражается в терминах углов, длин, объемов и т.д.
- Но соблюдение многих «гладких» принципов!
- Развитие Computer Science в 21 веке.

Геометрия плоских кривых


Плоские кривые

- Гладкая кривая на \mathbb{R}^2 — гладкое отображение $\gamma: [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^2$
- Вектор скорости — $\gamma'(s) = (x'(s), y'(s))$.




Дискретные кривые

- Дискретная кривая на \mathbb{R}^2 — кусочно-линейная функция
- Вектор скорости — а вот что это?



Касательный вектор

- Касательная к кривой $\gamma(t)$ в точке t_0 — предельное положение секущей через точки t_0 и $t_0 + \Delta$ при $\Delta \rightarrow 0$.
- Это и есть вектор **скорости**? (Да, и обычно нормируют.)



Определение

Две гладкие регулярные кривые **касаются в точке P** , если они обе проходят через эту точку и имеют в ней общую касательную.





Рис. 3: $y = x^2$, $y = \frac{1}{5}x^3$

Единичный вектор скорости

Единичный вектор скорости к кривой γ — это (нормированный) вектор скорости $T(s) := \gamma'(s)/\|\gamma'(s)\|$.



Длина дуги кривой. Натуральный параметр

Длина кривой γ —

$$L(\gamma) := L(\gamma)[a, b] := \int_a^b \|\dot{\gamma}(t)\| dt = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt.$$

Натуральный параметр s : $s - a = L(\gamma)[a, s]$. Тогда $\gamma(s)$ — натуральная параметризация.

Пусть $\dot{\gamma} := d\gamma/ds$. Ясно, что $\|\dot{\gamma}\| = 1$.

Натуральную параметризацию можно найти:

$$s(t) = \int_a^t \left\| \frac{d\gamma}{dt} \right\| dt.$$

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Длина кривой не меняется при монотонной замене параметра.

Доказательство.

Если $t = t(\tau)$, то $\gamma_1 := \gamma \circ t$ и


$$L(\gamma_1) = \int_a^b \left\| \frac{d\gamma_1}{d\tau} \right\| d\tau = \int_{t(a)}^{t(b)} \left\| \frac{d\gamma}{dt} \right\| \cdot \left| \frac{dt}{d\tau} \right| \cdot \frac{d\tau}{dt} dt = L(\gamma).$$



Вектор нормали

Нормаль к кривой γ — перпендикуляр к касательной.

Направляющий вектор нормали — $N(s) := (-y'(s), x'(s))$.



Касание порядка k

Гладкие регулярные кривые $r_1(s)$ и $r_2(s)$ имеют в точке 0 касание порядка k , если

$$r_1(0) = r_2(0), \quad \dot{r}_1(0) = \dot{r}_2(0), \quad \dots, \quad r_1^{(k)}(0) = r_2^{(k)}(0).$$

Лемма о перпендикулярности

Лемма о перпендикулярности

Пусть $a: t \mapsto a(t) \in \mathbb{R}^n$ — гладкая вектор-функция, причем $|a(t)| \equiv \text{const}$. Тогда $a'(t) \perp a(t)$.

Доказательство.

Продифференцируем $(a(t), a(t)) = \text{const}^2$ и получаем $2(a(t), a'(t)) = 0$. □

ТЕОРЕМА (о соприкасающейся окружности)

Пусть $\gamma(s)$ — рег. кривая и $\ddot{\gamma}(s_0) \neq 0$. Тогда $\exists!$ окружность, имеющая в точке s_0 касание второго порядка с γ , причем

(1) ее центр лежит на нормали в направлении $\ddot{\gamma}(s_0)$,

(2) ее радиус равен $|\ddot{\gamma}(s_0)|^{-1}$.

Доказательство.

Натуральная параметризация окружности

$$r(s) = \left(x_0 + R \cdot \cos \frac{s}{R}, y_0 + R \cdot \sin \frac{s}{R} \right).$$

Тогда

$$\ddot{r}(s) = -\frac{1}{R} \left(\cos \frac{s}{R}, \sin \frac{s}{R} \right), \quad |\ddot{r}| = R^{-1}.$$

По лемме о перпендикулярности $\dot{r}(s) \perp \ddot{r}(s)$.

Касание 2-го порядка \Leftrightarrow (1) и (2).




Кривизна

Кривизна — $k(s) := \|\ddot{\gamma}(s)\|$

Радиус кривизны — $R(s) = 1/k(s)$

Эквивалентно: $k(s) = \frac{d}{ds}\theta(s)$!




Дискретизация

Что такое хорошая дискретизация?


- Удовлетворяет известным гладким соотношениям (глобальным: интегрирование, теорема Стокса, и т.д.)
- Сходимость при приближении дискретного к гладкому
- Легко вычисляется!

Дискретная кривизна


Угол вращения




Вариация длин



Формула Штейнера




Соприкасающаяся окружность



Дискретная кривизна: соприкасающаяся окружность

Соприкасающаяся окружность




$$w_i := |\gamma_{i+1} - \gamma_{i-1}|$$

Можно вычислить радиус и кривизну:

$$k_i = \frac{1}{r_i} = 2\sin(\theta_i)/w_i.$$

Дискретная кривизна: угол вращения

Угол вращения



$$\kappa(s) = \frac{d}{ds} \varphi(s)$$


Дискретная кривизна: угол вращения

Как вычислить кривизну дискретной кривой?

Рассмотрим интеграл:

$$\begin{aligned}\int_a^b k(s) ds &= \int_a^b \left(\frac{d}{ds} \varphi(s) \right) ds = \\ &= \varphi(b) - \varphi(a)\end{aligned}$$

Voilà !




Дискретная кривизна: вариация длин

Упражнение:

Пусть $\gamma, \eta: [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\gamma(0) = \eta(0)$, $\gamma(L) = \eta(L)$, тогда

$$\left. \frac{d}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} L(\gamma + \varepsilon\eta) = - \int_0^L \langle \eta(s), k(s)N(s) \rangle ds.$$



Упражнение:

Пусть $\gamma: [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^2$, тогда

$$L(\gamma + \varepsilon N) = L(\gamma) - \varepsilon \int_0^L k(s) ds.$$

Дискретная кривизна: что в итоге выбрать?

- Какие задачи мы решаем?
- Какие свойства мы хотим?
- Какие соотношения должны выполняться?
- Вычислительная сложность?
- Нет однозначного ответа!
- Ни одна дискретизация не может удовлетворять всем свойствам сразу!

Список литературы:

[1] Keenan Crane — Discrete Differential Geometry: An Applied Introduction, 2018.

[2] А. О. Иванов, А. А. Тужилин — Лекции по классической дифференциальной геометрии, 2009, Москва, Логос.

Лекция 1, стр. 5 – 14

[3] А. И. Шафаревич — Курс лекций по классической дифференциальной геометрии, 2007, Москва, МГУ, Механико-математический факультет. *Лекция 1, стр. 3 – 10*