

# ГЕОМЕТРИЯ В КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ

Лекция 1: Введение и геометрия плоских кривых

---

Богачев Николай Владимирович

2 сентября 2020


MIPT & Skoltech

## Введение

---

# О чем вообще идёт речь?



Геометрия повсюду!



# О чем вообще идёт речь?

Как можно думать о геометрических формах и объектах:

- математически  
(дифференциальная геометрия)
- как о дискретных структурах и сетках  
(дискретная дифференциальная геометрия)



# Основные цели курса:

- Помогаем компьютерам!
- **Центральная идея:** Гладкое VS. Дискретное







Рис. 1: Поверхность Боя, Обервольфах, Германия и бутылка Клейна



# Приложения: Geometry Mesh Processing



# Приложения: Мультимедиа






# Приложения: анализ форм и изображений





# Приложения: симуляции



# Приложения: архитектура и дизайн



# Организация курса

- Страница курса:  
<https://nvbogachev.netlify.app/teaching/gcs20f>
- Связь: по почте [nvbogach@mail.ru](mailto:nvbogach@mail.ru)
- Лекции: слайды и, возможно, конспекты!
- Семинары: листочки с задачами
- Лабораторные работы: Python ...
- 2 контрольные работы

## Общий план (лекции + семинары + лабораторные)


- Гладкие кривые и поверхности
- Дискретные кривые и поверхности
- Внешние формы
- Дискретные внешние формы
- Лапласиан!
- Сглаживание и деформация

## Развитие геометрии

---

# Дифференциальная геометрия – вплоть до 20 века

- Локальные свойства формы
  - Скорость движения вдоль кривой
  - Локальное поведение поверхности и т.д.
- Связь локальных свойств с глобальными
- Всевозможные соотношения и развитие дифференциальной геометрии многообразий



# Дискретная дифференциальная геометрия – 21 век

- Никаких больше бесконечностей и производных!
- Все выражается в терминах углов, длин, объемов и т.д.
- Но соблюдение многих «гладких» принципов!
- Развитие Computer Science в 21 веке.


# Геометрия плоских кривых

---




# Плоские кривые

- Гладкая кривая на  $\mathbb{R}^2$  — гладкое отображение  $\gamma: [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^2$
- Вектор скорости —  $\gamma'(s) = (x'(s), y'(s))$ .




# Дискретные кривые

- Дискретная кривая на  $\mathbb{R}^2$  — кусочно-линейная функция
- Вектор скорости — а вот что это?



# Касательный вектор

- Касательная к кривой  $\gamma(t)$  в точке  $t_0$  — предельное положение секущей через точки  $t_0$  и  $t_0 + \Delta$  при  $\Delta \rightarrow 0$ .
- Это и есть вектор **скорости**? (Да, и обычно нормируют.)



## Определение

Две гладкие регулярные кривые **касаются в точке  $P$** , если они обе проходят через эту точку и имеют в ней общую касательную.





Рис. 3:  $y = x^2$ ,  $y = \frac{1}{5}x^3$

## Единичный вектор скорости

Единичный вектор скорости к кривой  $\gamma$  — это (нормированный) вектор скорости  $T(s) := \gamma'(s)/\|\gamma'(s)\|$ .



# Длина дуги кривой. Натуральный параметр

**Длина** кривой  $\gamma$  —

$$L(\gamma) := L(\gamma)[a, b] := \int_a^b \|\dot{\gamma}(t)\| dt = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt.$$

**Натуральный параметр**  $s$ :  $s - a = L(\gamma)[a, s]$ . Тогда  $\gamma(s)$  — натуральная параметризация.

Пусть  $\dot{\gamma} := d\gamma/ds$ . Ясно, что  $\|\dot{\gamma}\| = 1$ .

**Натуральную параметризацию** можно найти:

$$s(t) = \int_a^t \left\| \frac{d\gamma}{dt} \right\| dt.$$

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Длина кривой не меняется при монотонной замене параметра.

Доказательство.

Если  $t = t(\tau)$ , то  $\gamma_1 := \gamma \circ t$  и


$$L(\gamma_1) = \int_a^b \left\| \frac{d\gamma_1}{d\tau} \right\| d\tau = \int_{t(a)}^{t(b)} \left\| \frac{d\gamma}{dt} \right\| \cdot \left| \frac{dt}{d\tau} \right| \cdot \frac{d\tau}{dt} dt = L(\gamma).$$



## Вектор нормали

Нормаль к кривой  $\gamma$  — перпендикуляр к касательной.

Направляющий вектор нормали —  $N(s) := (-y'(s), x'(s))$ .





## Касание порядка $k$

Гладкие регулярные кривые  $r_1(s)$  и  $r_2(s)$  имеют в точке 0 касание порядка  $k$ , если

$$r_1(0) = r_2(0), \quad \dot{r}_1(0) = \dot{r}_2(0), \quad \dots, \quad r_1^{(k)}(0) = r_2^{(k)}(0).$$

# Лемма о перпендикулярности

## Лемма о перпендикулярности

Пусть  $a: t \mapsto a(t) \in \mathbb{R}^n$  — гладкая вектор-функция, причем  $|a(t)| \equiv \text{const}$ . Тогда  $a'(t) \perp a(t)$ .

Доказательство.

Продифференцируем  $(a(t), a(t)) = \text{const}^2$  и получаем  $2(a(t), a'(t)) = 0$ . □

## ТЕОРЕМА (о соприкасающейся окружности)

Пусть  $\gamma(s)$  — рег. кривая и  $\ddot{\gamma}(s_0) \neq 0$ . Тогда  $\exists!$  окружность, имеющая в точке  $s_0$  касание второго порядка с  $\gamma$ , причем

(1) ее центр лежит на нормали в направлении  $\ddot{\gamma}(s_0)$ ,

(2) ее радиус равен  $|\ddot{\gamma}(s_0)|^{-1}$ .

Доказательство.

Натуральная параметризация окружности

$$r(s) = \left( x_0 + R \cdot \cos \frac{s}{R}, y_0 + R \cdot \sin \frac{s}{R} \right).$$

Тогда

$$\ddot{r}(s) = -\frac{1}{R} \left( \cos \frac{s}{R}, \sin \frac{s}{R} \right), \quad |\ddot{r}| = R^{-1}.$$

По лемме о перпендикулярности  $\dot{r}(s) \perp \ddot{r}(s)$ .

Касание 2-го порядка  $\Leftrightarrow$  (1) и (2).




# Кривизна

Кривизна —  $k(s) := \|\ddot{\gamma}(s)\|$

Радиус кривизны —  $R(s) = 1/k(s)$

Эквивалентно:  $k(s) = \frac{d}{ds}\theta(s)$  !



# Дискретизация


---

## Что такое хорошая дискретизация?


- Удовлетворяет известным гладким соотношениям (глобальным: интегрирование, теорема Стокса, и т.д.)
- Сходимость при приближении дискретного к гладкому
- Легко вычисляется!

# Дискретная кривизна


Угол вращения




Вариация длин



Формула Штейнера




Соприкасающаяся окружность





# Дискретная кривизна: соприкасающаяся окружность

## Соприкасающаяся окружность




$$w_i := |\gamma_{i+1} - \gamma_{i-1}|$$

Можно вычислить радиус и кривизну:

$$k_i = \frac{1}{r_i} = 2\sin(\theta_i)/w_i.$$

# Дискретная кривизна: угол вращения

Угол вращения



$$\kappa(s) = \frac{d}{ds} \varphi(s)$$


# Дискретная кривизна: угол вращения

Как вычислить кривизну дискретной кривой?

Рассмотрим интеграл:

$$\begin{aligned}\int_a^b k(s) ds &= \int_a^b \left( \frac{d}{ds} \varphi(s) \right) ds = \\ &= \varphi(b) - \varphi(a)\end{aligned}$$

Voilà !




# Дискретная кривизна: вариация длин

## Упражнение:

Пусть  $\gamma, \eta: [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $\gamma(0) = \eta(0)$ ,  $\gamma(L) = \eta(L)$ , тогда

$$\left. \frac{d}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} L(\gamma + \varepsilon\eta) = - \int_0^L \langle \eta(s), k(s)N(s) \rangle ds.$$



## Упражнение:

Пусть  $\gamma: [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^2$ , тогда

$$L(\gamma + \varepsilon N) = L(\gamma) - \varepsilon \int_0^L k(s) ds.$$

# Дискретная кривизна: что в итоге выбрать?

- Какие задачи мы решаем?
- Какие свойства мы хотим?
- Какие соотношения должны выполняться?
- Вычислительная сложность?
- Нет однозначного ответа!
- Ни одна дискретизация не может удовлетворять всем свойствам сразу!

## Список литературы:

[1] Keenan Crane — Discrete Differential Geometry: An Applied Introduction, 2018.

[2] А. О. Иванов, А. А. Тужилин — Лекции по классической дифференциальной геометрии, 2009, Москва, Логос.

*Лекция 1, стр. 5 – 14*

[3] А. И. Шафаревич — Курс лекций по классической дифференциальной геометрии, 2007, Москва, МГУ, Механико-математический факультет. *Лекция 1, стр. 3 – 10*